

稲作情報



みやぎ仙南農業協同組合
米穀課 0224-55-1590

令和4年6月1日

～田植え後の水管理を徹底し生育確保と除草剤の効果を高めましょう～

今後の管理については、圃場を見回り、苗の初期生育と除草剤の効果を高める為、下記の通り適切な水管理を行いましょう。




天気が良好な場合……浅水管理(2～3cm程度)

低温、曇天の場合……深水管理(5～6cm程度)

※生わらや未熟たい肥をすき込んだ圃場ではガスが発生して生育を阻害する恐れがありますので、その際は、一時落水をして土壌への酸素供給とガス抜きを行いましょう!

★水管理の目安★



⚠️ 残苗の放置が散見されます。早急に処分してください。⚠️



田植え後、補植用に置かれた苗が散見されます。

放置していると、いもち病や初期害虫の温床になり、

また、根が張り処分が困難になりますので、補植

(浮苗挿し)作業の必要がない圃場では、残苗を

裏返しや埋める等して、早急に処分してください。

雑草は残っていませんか??



こだわり米のほ場で追加防除をした場合、栽培中止報告書の提出が必要です。



散布時期の遅れや抵抗性雑草の多発により、水田に雑草が残っている場合は稲の生育に影響を及ぼしますので、早めの追加防除を行いましょ。

薬剤名	10aの使用量	使用時期	対象雑草
クリンチャー1 _キ 粒剤	1～1.5kg	移植後25日～ノビエ5葉期 ※収穫30日前まで使用可。	ヒエ専用剤。ヒエ以外の広葉雑草には効果がありません。 1kg(ノビエ4葉期まで) 1.5kg(ノビエ5葉期まで)
バサグラン粒剤	3～4kg	移植後15～55日 ※収穫60日前まで使用可。	イネ科雑草除く。 特に、クログワイ、オモダカ、シスイに効果大。 落水散布
クリンチャーバスME液剤	1,000ml (希釈水量70～100ℓ)	移植後15日～ノビエ5葉期 ※収穫50日前まで使用可。	クリンチャー + バサグラン の混合剤。 ノビエ、ホタルイ、オモダカ、クログワイ。 落水散布。
ワイドアタックSC	100ml (希釈水量100ℓ)	移植後20日 (稲5葉期以降) ～ノビエ6葉期 ※収穫30日前まで使用可。	ノビエ、ホタルイ、オモダカ、クログワイ。 落水散布。

中干し実施について

中干しは稲の根に酸素を送ることにより根の活力を高めるほか、株元に光を当てることにより無効分けつを抑える効果がありますので、有効茎数(目安:坪60株植えて1株当たり25本以上)が確保したら早めに中干し(7日～10日間程度)を行いましょ。

また、排水不良の圃場や日数がかかる大区画圃場では溝切により排水しやすくすることで効果が上がります。

中干しの程度は…

田面に小さな亀裂が入る程度。
田面に足跡が付く程度の硬さ。
排水不良の水田は溝切が有効。

中干し終了後の水管理… 急に湛水にはせずに、走水から行い間断かん水にする。



復元田、転作跡地等では倒伏しないように強めの中干しを実施しましょ!!

～ JA出荷者へお知らせ ～

米の栽培記録簿(前期)の提出期日は **6月27日(月)** となっておりますので、必要事項を記入し、両面とも再度内容をご確認の上、提出頂きますようお願い致します。